

**TERAPIA DOPO IL PRELIEVO OVOCITARIO**

Sant'Agata li Battiati, li.....

Sig.ra ..... anni .....

ID:

Pr. **Cefamezin 1 gr** - Fiala intramuscolo  
Una fiala stasera a circa dodici ore dalla prima.

Pr. **Flogan Day cps.**  
Una compressa al giorno lontano dai pasti da oggi per 5 giorni.

Pr. **Acido folico.**  
Proseguire secondo le indicazioni del medico fino all'esito del 2° test di gravidanza.  
Se positivo andrà assunto per tutto il decorso della gravidanza, se invece anche il 2° test dovesse risultare negativo può essere sospeso.

Pr. **Prontogest 100 mg** - Fiale intramuscolo  
Mezza fiala intramuscolo al giorno da domani sera (l'altra ½ si butta) fino al 2° test di gravidanza, quindi andrà continuato se il test sarà positivo o interrotto se negativo (per l'iniezione si consiglia di usare l'ago 21 G / verde).

- Se già in terapia, continuare con ***Deltacortene*** una compressa al giorno e ***Metforal*** secondo il dosaggio prescritto dal medico.

N.B.: il trasferimento in utero degli embrioni avverrà a distanza di 2-5 gg dal prelievo ovocitario e viene eseguito sotto controllo ecografico per via trans-addominale. Per conseguenza, la paziente si deve presentare con la vescica piena.

Firma del Medico.