


TERAPIA E PRESCRIZIONI DOPO IL TRASFERIMENTO EMBRIONARIO

TEST di gravidanza (dosaggio ematico della β -HCG)

- Continuare con l'assunzione giornaliera di **Acido folico**.
Interrompere solo se entrambi i test di gravidanza danno esito negativo.
- Continuare con $\frac{1}{2}$ fiala al giorno di **Prontogest 100 mg**
(per l'iniezione si consiglia di usare l'ago 21 G / verde).
Interrompere solo se entrambi i test di gravidanza danno esito negativo.
- Continuare con il **Bromecin** (2 compresse al giorno) per i restanti giorni, in tutto 5.
- Se già in terapia con **Deltacortene 5 mg** continuare fino a diversa prescrizione del medico.
- Sulla base delle prescrizioni, iniziare l'assunzione di una compressa al giorno di **Cardioaspirin** a stomaco pieno o una fiala al giorno di **Clexane 2000 UI** per via sottocutanea.
- Per le pazienti già in terapia con il **Metforal**, continuare con l'assunzione giornaliera di metformina secondo il dosaggio prescritto dal medico.
(Il Metforal va assunto anche durante la gravidanza, sarà il medico ad indicare come e quando interrompere la terapia).
- -----

Il test di gravidanza deve essere eseguito a 14 giorni dal trasferimento ed essere ripetuto in ogni caso per conferma dopo 2 giorni senza interrompere la terapia.

A distanza di circa 8-10 giorni dal trasferimento può verificarsi una piccola perdita ematica, legata ai processi di impianto, che non deve destare alcuna preoccupazione. Se si dovessero, invece, presentare dolori addominali importanti, telefonare al Centro per prenotare un eventuale controllo ecografico.